PARÁLISIS AGUDA DE EXTREMIDADES EN PERROS Y GATOS

Uno de los problemas neurológicos más comunes en consulta es la parálisis aguda; sin embargo los estudiosos de esta afección tan frecuente aún están lejos de encontrar las causas que la originan.

PARÁLISIS REPENTINA

La parálisis aguda provoca la pérdida de movilidad de una o todas las extremidades del animal, de forma gradual o repentina. A ello se suma la capacidad de observación del propietario para detectarla y acudir cuanto antes al profesional veterinario. Y dependiendo de la detección, ésta puede ser irreversible o presentar posibilidades de mejora.

Es por eso que se siguen realizando estudios como el que se muestra en este post, donde el equipo formado por *Graham Rossi*, *Alexandra Stachel*, *Alex M. Lynch* y *Natasha Olby*, han realizado en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, en EEUU.

Además de conocer la frecuencia de diagnóstico, que ayuda a priorizar entre las distintas evaluaciones clínicas y facilita la planificación de recursos y el diseño de ensayos clínicos, agiliza la decisión de los



cuidados necesarios a aplicar, mejorando así la calidad de vida de los pacientes.

ÚLTIMOS HALLAZGOS

A grandes rasgos los resultados del estudios revelan que la enfermedad del disco intervertebral (IVD) es la causa más común de parálisis aguda en perros; y el tromboembolismo aórtico (ATE) en gatos.



En el estudio se realizaron búsquedas en los registros médicos de la sala de emergencias del NC State Veterinary Hospital durante 5 años para detectar los casos de mascotas que presentan paraparesia o parálisis aguda. Según los resultados aportados, del total de **21.535** perros, **845** estaban afectados con parálisis aguda (**3,9 %**) y de **4.589** gatos, **66** (**1,4 %**).

EN PERROS

El estudio además, profundiza en las causas siendo la enfermedad del disco intervertebral la más común que generó parálisis, alcanzando a **608** perros de **845** (**72 %**); seguida de la enfermedad vascular que afectó a **34** canes (**4 %**) y el otro **20%** restante fueron diagnosticados con otras enfermedades.

De las razas más afectadas, el **teckel** representaba el **31,1%** siendo **263** de los **845** canes, seguido del **labrador retriever**, con **57** casos (**6,7 %**).

EN GATOS

En los pacientes felinos, el tromboembolismo aórtico fue el diagnóstico más común, afectando a **40** de los **66** gatos (**60,6 %**) seguido de la enfermedad del disco intervertebral alcanzando el **10,6 %.** El resto de gatos (**30,3 %**) presentaban otras enfermedades.

Algunos casos fueron categorizados como pseudo-parálisis con un diagnóstico no neurológico, en **6** perros de los **845** y **2** gatos del total de **66**.

Dichos resultados nos van encauzando en el camino a seguir para el diagnóstico y causas de dicha parálisis aguda, aunque todavía queda mucho por investigar. Si bien es cierto, que con estos datos ya podemos afinar un poco.

